

Pourquoi fait-on cet examen ?

Pour rechercher le ou les germe(s) d'une infection pulmonaire et déterminer le traitement antibiotique adapté.

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire met à votre disposition des pots stériles à bouchon rouge réservés à ce type de prélèvement. Une fiche de renseignements patient est à remplir afin de traiter au mieux votre examen : merci d'y indiquer le contexte clinique, et si un traitement antibiotique a été débuté.

Quand faire le crachat ?

- ✓ Avant tout traitement antibiotique ou arrêt depuis 48/72 heures (selon demi-vie de l'antibiotique).
- ✓ Le matin au lever, à jeun

Comment faire le recueil de crachat ?

Faire un effort de toux afin de recueillir la totalité du crachat dans le flacon et **non pas de la salive**.

Le prélèvement doit être rapporté de suite au laboratoire (dans les 2 heures) accompagné de la fiche de renseignements patient remplie

Remarque :

- ✓ La recherche de BK doit être faite sur un pot stérile dédié à cet examen (ne pas faire un seul pot pour ECBC et BK) : celui-ci peut être conservé à +4°C au réfrigérateur et ramené plus tardivement.

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes fournies après création du dossier informatique.